

## 13.2. 三角函數 – 基本運用


三角函數最基本嘅問題係要你去求直角三角形內某條邊或者某隻角。

做依 D 問題最緊要記得  $\sin, \cos, \tan$  嘅定義，然後擇個啱用嘅嚟計條數。

留意係任何一條三角比嘅式中都係有三個變數（兩條邊同一隻角），所以只要我哋知道條式中嘅其中兩個數，第三個數就可以計到出嚟。

例子 1： 求右圖三角形中的  $x$  及  $\theta$ 。

解說： 首先留意題目中嘅三角形是直角三角形，所以可以用  $\sin, \cos$  等嚟求  $\theta$  同  $x$ 。



要決定用邊個三角函數嚟計  $\theta$ ，我哋就先要睇吓有邊 2 條邊嘅長度係已知嘅：

- “4” 是  $\theta$  嘅鄰邊，“8” 是斜邊。
- 有“鄰邊”及“斜邊”出現嘅函數是  $\cos$
- 所以我哋要嘅式係：
$$\cos\theta = \frac{4}{8}$$
- 用計數機計一計，可求得：
$$\theta = 60^\circ$$

計  $x$  嘅方法：

- 因  $x$  是一條邊，所以如果用三角函數，我哋要知道另一條邊同一隻角
- $\theta$  已知是  $60^\circ$ ；另一條邊可選“4”
- 因為我哋用  $\theta$ ，所以  $x$  是“對邊”，“4”係“鄰邊”
- 有“對邊”及“鄰邊”嘅是  $\tan$
- 所以我哋要嘅式係：
$$\tan 60^\circ = \frac{x}{4}$$
- 用計數機計一計，可求得：
$$x = 4 \tan 60^\circ = 6.93$$

第二個計  $x$  嘅方法是用“8”。咁要用嘅係  $\sin$  (因有“對邊”及“斜邊”)。  
第三個方法是用畢氏定理。

例子 2： 求右圖三角形中的  $y$ 。

解說： 留意對  $30^\circ$  來說，“ $y$ ” 是對邊；“4” 是斜邊。  
所以我哋要用  $\sin$ ：

$$\sin 30^\circ = \frac{y}{4}$$

$$y = 4 \sin 30^\circ = 2$$

